

NO.

氏名:

生年月日: / 生まれ

不活化ワクチン

5種混合(DPT+IPV+Hib) 4種混合(DPT+IPV) 3種混合(DPT)
ヒブ 肺炎球菌(15・20価) 髄膜炎菌 HPV 不活化ポリオ(IPV)
B型肝炎 インフルエンザ 日本脳炎 二種混合(DT) 破傷風 A型肝炎

生ワクチン

麻しん風しん(MR) おたふくかせ 水痘 BCG
ロタウイルス(1価、5価)(内服・経口ワクチン)
経鼻インフルエンザ

- ✓ 注射の生ワクチンから異なる注射の生ワクチンを接種する場合は、中 27 日以上あける
✓ 同一のワクチンは決められた接種間隔を守る

● [/ ()] 以降

口タ1 + 5種1 + 肺炎1 + B型1

生後2か月から

4週間後

● [/ ()] 以降

口タ2 + 5種2 + 肺炎2 + B型2

4週間後

● [/ ()] 以降

口タ3 + 5種3 + 肺炎3 + []

4週間後

● [/ ()] 以降

BCG + [] + [] + []

生後5か月から

週間後

● [/ ()] 以降

B型3 + [] + [] + []

1回目から139日以上

週間後

11月 calendar grid

12月 calendar grid

2025年1月 calendar grid

2月 calendar grid



これは、あくまでも予定表です。
実際の接種申し込みは、
窓口・電話・インターネット・携帯をご利用ください。
予約は4週間前からとなります。